



水田雑草の防除に努めましょう！

雑草が多いと、風通しが悪くなり、稲の病気が発生する原因になります。また、稲刈時コンバインに負荷がかかり故障の原因となります。

多年生雑草とは

秋冬や夏の高温時に地上部が枯れても、地下部の根茎や塊茎などは生存して残り、そこからまた成長するものを指します。

水田の代表的な雑草



一年生雑草とは

毎年新しい種子から発生する雑草を指します。

特にノビエに注意!!


水田雑草の中でも生育量が大きいため、多発すると養分や光を横取りして稲の生育を妨げ、収量を低下させてしまいます。つまり、ノビエとの競合によって主に稲の穂数が減少することで減収につながります。また、ノビエ等が多発している圃場では稲の害虫であるカメムシが発生し、食害を受けて米に黒い斑点がつき品質が悪くなるため、確実にノビエを防除しておきましょう。

ノビエの近くにある稲は、ノビエから3m離れた稲に比べ、一粒一粒が小さく、粒数も少ない。



ノビエの近くにある稲

ノビエから3m離れた稲



POINT



農薬散布後7日間は効果が低下してしまうため、落水やかけ流しをしない！
また、水域の動植物に影響を与える可能性があるため、環境の保全のためにも水管理を徹底しましょう。

	品名	対応雑草	散布量	使用時期
一発処理除草剤	ワザアリ楽粒	一年生雑草・マツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ・セリ・オモダカ・クログワイ	10a当たり250g	移植直後～ノビエ3葉期 (但し、移植後30日まで)
	エンペラージャンボ	一年生雑草・ホタルイ・クログワイ・オモダカ・ミズガヤツリ		
中期除草剤	セカンドショットS ジャンボMX	一年生雑草・マツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ・セリ・オモダカ・クログワイ・キシウスズメノヒエ	10a当たり500g	移植後14日～ノビエ3.5葉期 (但し、収穫45日前まで)
	ウィードコア1キロ粒剤	一年生雑草・キシウスズメノヒエ・多年生広葉雑草	10a当たり1kg	移植後7日～ノビエ4葉期 (但し、収穫60日前まで)