




夏野菜の植え付けについて

トマト、ナス、キュウリの
植え付けのめやす

▼植え付けのポイント

- 天気がよく暖かい日に植え付けましょう。
- 植え付け前日、植え付け後には水やりし、根張りをよくしましょう。
- 根鉢にわずかに土がかかる程度に浅植えし、根張りをよくしましょう。



徒長苗の場合



▼徒長苗とは？

蜜植、日照不足、水分の多すぎ、高温などが原因で発生します。茎が間延びしてひょろひょろしているのが特徴です。

▼植え付けまで

苗どうしの間隔を広げ風通し、日当たりをよくしましょう。水やりは午前中1回にして、夕方には乾き気味にしましょう。

少し深めに植え、支柱をして支えましょう。(接ぎ木苗の場合、接いだ部分は地上に出します。)

▼植え付け時

根詰まりしているときは、根鉢をほぐしてから植えましょう。

▼植え付け時

液肥を散布し、勢いを回復させましょう。できるだけ早く植えますが、しばらく植えない場合は一回り大きな鉢に移し替えましょう。

老化苗の場合



▼老化苗とは？

生育が悪く長期間育苗している場合や、植え付けが遅れた場合に発生します。根が底でぐるぐる回って伸びて根詰まりしたり、肥料が切れて葉色も薄いのが特徴です。

引用:
サカタのタネ
園芸通信
初心者さんも
やってみよう!
タネまきから
苗育てAtoZ
【第18回】
苗が育たない悩みと
老化について

害虫を予防しましょう



▼トマト、ナス、キュウリに適応のある農薬の例

商品名	対象病害虫	使用量	使用方法
ジェイエース粒剤	アブラムシ類・アザミウマ類・コナジラミ類等	1~2g/株	作条散布又は植穴処理
スタークル粒剤	アブラムシ類・アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類等	1~2g/株	株元散布又は植穴処理
ダイアジノン粒剤5	コガネムシ類幼虫・ネキリムシ類・ケラ等	4~6kg/10a	全面土壤混和又は作条土壤混和

※作物によっては生育中も使用できます。



植え付け時に農薬を施用する、それから後の散布を減らせますので、例年害虫被害がある場合は利用してみましょう。